


予察灯によるアカヒゲホソミドリカスミカメの誘殺消長【令和8年(2026年)】



※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均

・上田市では、5月第4半旬に3頭の初誘殺が確認されました。その後は平年並みで推移しましたが、6月第3半旬には誘殺数が増加しました。6月第4半旬以降は平年よりやや少なく推移しましたが、7月第2半旬以降は平年と比べ多くなりました。

・伊那市では、5月第4半旬に初誘殺が1頭確認され、その後は平年並に推移したものの、7月第1半旬から第3半旬までは平年と比べ少なく推移しました。しかし、7月第6半旬は平年と比べ多くなりました（6月第4半旬～第5半旬は予察灯の電球切れのため欠調）。


・飯田市では、5月第3半旬に1頭初誘殺され、その後は平年並に推移したものの、6月第5半旬以降は平年と比べ少なく推移しました。

・南木曽町では、6月第4半旬に2頭初誘殺され、その後は平年と比べ少なく推移しましたが、7月第4半旬は平年と比べ多く推移しました。7月第5旬以降は平年と比べ少なく推移しました（6月第6半旬～7月第1半旬は予察灯の電球切れのため欠調）。


・安曇野市では、6月第4半旬に7頭初誘殺され、その後は平年と比べ少なく推移しました。しかし、7月第4半旬は平年並となりました（6月第2半旬、7月第4半旬～第6半旬は予察灯の電球切れのため欠調）。

・須坂市八重森では、5月第4半旬に初誘殺が1頭確認されました。その後の誘殺数は平年と比べやや少なく推移しましたが、6月第6半旬には平年と比べかなり多くなりました。7月第1半旬には再び平年より少なく推移しましたが、7月第2半旬～第4半旬は平年と比べかなり多くなりましたが、7月第5半旬以降は平年並となりました。


・須坂市小河原では、5月第6半旬に2頭初誘殺され、その後は平年と比べやや少なく推移しましたが、7月第2半旬以降は平年と比べ多くなりました。なお、7月第6半旬は平年と比べ少なく推移しました。




※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均




※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均




※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均



※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均



※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均



※平年:平成28年～令和7年(10年間)の平均

(参考)

1 発生生態

斑点米を発生させる主要害虫のアカヒゲホソミドリカスミカメは水田周辺の雑草地で年4～5世代発生を繰り返します。主として7月中旬以降に発生する第2世代成虫がイネの出穂に伴い水田へ侵入、稲穂にとりついて吸汁加害します。出穂期の早い早生品種で被害が多くなる傾向にあります。上のグラフは予察灯(ライトトラップ)で捕獲された成虫数です。

2 防除時期・対策等

出穂期10日後に防除を実施し、常発地では7日～10日後に追加散布を行います。粒剤は効果の発現までに時間を要するため、3日程度早く処理します。田畦畔の草刈りは出穂2週間前までに実施し、出穂直前はカメムシを水田内に追い込む恐れがあるため行いません。