


# 令和7年フェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長

農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長調査の結果です。  
(農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)


## ◎ヨトウガ 【コメント】

- ・塩尻市では、誘殺頭数は6月中下旬は平年と比べやや少なかったが、その他の期間は平年と比べやや多く、8月第3半旬から急増し、平年と比べかなり多かった。
- ・須坂市では、4月第4半旬に初誘殺された。5月～8月の誘殺頭数はほぼ平年並であった。
- ・茅野市では、5月第3半旬までは平年と比べやや多かったが、5月第4半旬～8月第5半旬は、平年並～平年と比べやや少なかった。
- ・原村では、5月第5半旬～8月第5半旬の誘殺頭数は、6月第2半旬を除き、平年並～平年と比べやや少なかった。
- ・南箕輪村では、調査開始の5月第1半旬から誘殺され、5月の誘殺頭数は、過去5か年の平均値と比べ多かったが、6月は平年と比べやや少なかった(調査終了)。


塩尻市宗賀 野菜花き試験場(alt.750m)県発生予察ほ




須坂市小河原 農業試験場 (alt.360m)




茅野市玉川(alt.1,128m)



原村中新田(alt.987m)







南箕輪村(alt.700m)



## ◎ハスモンヨトウ

### 【コメント】

- ・塩尻市では、ほぼ平年並の5月第4半旬に初誘殺され、6月～8月第6半旬まで、平年と比べ誘殺頭数が多い状況が続いている。
- ・須坂市では、平年と比べやや早い、5月第2半旬に初誘殺され、7月上旬まで平年並の誘殺頭数であったが、7月第3半旬以降、平年と比べ誘殺頭数が多い。
- ・上田市菅平高原では、平年と比べやや遅い、6月第4半旬に初誘殺され、平年並の誘殺頭数で推移していたが、8月に入りやや多くなり、第5半旬に急増した。
- ・南箕輪村では、5月第5半旬に初誘殺され、6月第3半旬に急増し、6月第4、第5半旬は過去3年間の平年値の約2～3倍の誘殺頭数であった。



## ◎シロイチモジヨトウ

### 【コメント】

- ・塩尻市では、平年と比べやや遅い5月第6半旬に初誘殺され、6月以降、誘殺頭数は平年と比べかなり多かった。
- ・長野市では、平年と比べやや遅い6月第3半旬に初誘殺され、7月第2半旬まで平年並の誘殺頭数であったが、8月第4半旬以降、平年と比べやや多かった。

