

令和8年フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長(1)東北信


農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長調査の結果です。

(農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)


【コメント】

- ・小諸市では、平年よりも早い発生で、6月以降は平年よりも多い誘殺数で推移している。
- ・須坂市では、平年よりも早い発生で、平年並みの少ない誘殺数で推移している。
- ・御代田町では、発生時期は概ね平年並みで、誘殺数は5月第6半旬以降、平年よりも多い誘殺数で推移している。
- ・佐久穂町では、平年よりも早い発生で、平年並みの少ない誘殺数で推移している。
- ・上田市泉田では、平年よりも早い発生であったと推察され、6月第2半旬の誘殺ピーク以降は平年並みの少ない誘殺数で推移している。
- ・上田市菅平高原では、5月第5半旬に初誘殺がみられ、平年並みの少ない誘殺数で推移している。
- ・飯山市では、発生時期は概ね平年並みで、6月第2半旬と7月第4半旬に誘殺ピークがあり、平年よりもやや多い誘殺数で推移している。
- ・中野市では、発生時期は概ね平年並みで、6月第2半旬と7月第4半旬に誘殺ピークがあり、平年よりもやや少ない誘殺数で推移している。


小諸市山浦 野菜花き試験場佐久支場(alt.812m)県発生予察ほ



須坂市小河原 農業試験場(alt.360m)



御代田町草越



佐久穂町松井

