






令和8年フェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長

農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長調査の結果です。
(農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)

◎ヨトウガ 【コメント】

- ・塩尻市では、5月第1半旬から誘殺がみられ、5月の誘殺数は平年よりもやや多かったが、6月以降は概ね平年並みに推移している。
- ・須坂市では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は概ね平年並み、誘殺数は5月第3～第5半旬は平年よりもやや少なかったが、以降は概ね平年並みで推移している。
- ・茅野市では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は6月第2半旬まで平年よりもやや多く推移したが、以降は概ね平年並みとなっている。
- ・原村では、4月第3半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は5月第6半旬まで平年よりも少なく、以降は概ね平年並み、8月第2半旬で増加している。
- ・南箕輪村では、5月第1半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早いと推定され、誘殺数は平年よりも少なく推移したが、7月第5半旬にピークがみられ、8月第6半旬に急増している。




◎ハスモンヨトウ


【コメント】

- ・塩尻市では、5月第4半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、以降、誘殺数は平年よりも概ね多く推移、7月第4半旬に急増した。その後はほぼ平年並みに推移している。
- ・須坂市では、5月第5半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は増減がありながらも概ね平年並みで推移したが、8月第6半旬で急増している。
- ・上田市では、5月第6半旬に誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、以降は平年並み～やや少なく推移している。
- ・南箕輪村では、5月第3半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は6月第5、6半旬が多かった以外は、概ね平年並みに推移している。


塩尻市宗賀 野菜花き試験場 (alt.750m) 県発生予察ほ




須坂市小河原 農業試験場 (alt.360m)



上田市菅平高原 (alt.1,260m) 地区発生予察ほ



南箕輪村 (alt.700m)




◎シロイチモジヨトウ

【コメント】

- ・塩尻市では、5月第5半旬に初誘殺がみられ、以降の誘殺数は概ね平年並みで推移したが、8月第1半旬に誘殺ピークがあり、8月第6半旬で急増している。
- ・長野市では、7月第3半旬に初誘殺がみられ、8月第2半旬に誘殺ピークがあり、誘殺数が多かった。

塩尻市宗賀 野菜花き試験場 (alt.750m) 県発生予察ほ



長野市上ヶ屋 (alt.1,070m) 地区発生予察ほ

