令和８年フェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長


農業農村支援センター、試験場で実施したフェロモントラップによるヨトウガ類誘殺消長調査の結果です。
（農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。）

◎ヨトウガ

【コメント】


・塩尻市では、５月第１半旬から誘殺がみられ、５月の誘殺数は平年よりもやや多かったが、６月以降は増減はあるが、概ね平年並みに推移している。
・須坂市では、４月第３半旬から誘殺がみられ、発生時期は概ね平年並み、誘殺数は５月第３～第５半旬は平年よりもやや少なかったが、以降は概ね平年並みで推移している。
・茅野市では、４月第３半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は６月第２半旬まで平年よりもやや多かったが、以降は平年並み～少なく推移している。
・原村では、４月第３半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早く、誘殺数は５月第６半旬まで平年よりも少なく、６月～７月にかけては概ね平年並み、８月第２～第４半旬は平年よりも多かったが、以降は概ね少なく推移している。
・南箕輪村では、５月第１半旬から誘殺がみられ、発生時期は平年よりも早いと推定され、誘殺数は７月第５、第６半旬と８月第６半旬に平年よりも多かった以外は少なく推移した。

塩尻市宗賀 野菜花き試験場（alt.750m）県発生予察ほ




*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊農業試験場病害虫防除部　調査

須坂市小河原 農業試験場（alt.360m）




*平年値は過去10ヵ年平均値　　*農業試験場環境部　調査

茅野市玉川（alt.1,128m）




*平年値は過去10ヵ年平均値　　*諏訪農業農村支援センター調査

原村中新田（alt.987m）



*平年値は過去4ヵ年平均値　　*諏訪農業農村支援センター調査

南箕輪村（alt.700m）




*平年値は過去7ヵ年平均値　　*上伊那農業農村支援センター調査

◎ハスモンヨトウ

【コメント】


・塩尻市では、５月第４半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、以降、誘殺数は平年よりも概ね多く推移、７月第４半旬に急増した。その後減少したが、８月第５半旬以降は平年よりも多く推移している。
・須坂市では、５月第５半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は増減がありながらも概ね平年並みで推移したが、８月第６半旬、９月第５、第６半旬は平年よりもかなり多かった。
・上田市では、５月第６半旬に誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は10月第１半旬が平年よりも多かった以外は、平年並み～やや少なく推移している。
・南箕輪村では、５月第３半旬から誘殺がみられ、誘殺時期は平年よりも早く、誘殺数は６月第５、６半旬が多かった以外は、概ね平年並みに推移している。

塩尻市宗賀 野菜花き試験場（alt.750m）県発生予察ほ




*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊農業試験場病害虫防除部　調査

須坂市小河原 農業試験場（alt.360m）




*平年値は過去10ヵ年平均値(令和6年を除く)　　*農業試験場環境部　調査

上田市菅平高原（alt.1,260m）地区発生予察ほ



*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊農業試験場病害虫防除部　調査

南箕輪村（alt.700m）




*平年値は過去3ヵ年平均値　　＊上伊那農業農村支援センター　調査

◎シロイチモジヨトウ

【コメント】


・塩尻市では、５月第５半旬に初誘殺がみられ、８月第１半旬と８月第６半旬に誘殺数が多かった以外は概ね平年並みで推移している。
・長野市では、７月第３半旬に初誘殺がみられ、８月第２半旬に誘殺数が多かった。８月第４半旬以降は概ね平年並みの誘殺数で推移している。

塩尻市宗賀 野菜花き試験場（alt.750m）県発生予察ほ



*平年値は過去10ヵ年平均値　　＊農業試験場病害虫防除部　調査

長野市上ヶ屋（alt.1,070m）地区発生予察ほ



*平年値は過去8ヵ年平均値　　＊農業試験場病害虫防除部　調査