

(別表1) 指定農薬危被害防止対策推進要領第2に基づく指定農薬

指定農薬名	該当銘柄名	対象作物	危被害の対象	留意事項	
合成ピレスロイド剤	シクロサルU粒剤2 シクロバック粒剤 トレボン粒剤 トレボンサーフ なげこみトレボン	水稲	蚕児 魚介類	シクロサルU粒剤2・トレボン粒剤は桑園に隣接した水田では絶対に使用せず、桑園と20m以上間隔をとること。養魚池に流入するおそれのあるところでは使用しないこと。	
	トレボン粉剤DL トレボン乳剤 トレボンスカイMC			指定地域以外では使用しないこと。 (別表2)	
	MR. ジョーカー粉剤DL <sup>1)</sup>				
	合成ピレスロイド剤	アーデント水和剤 アグロスリン水和剤・乳剤 アディオソ水和剤・乳剤 アディオソフロアブル イカズチWDG サイハロン水和剤 スカウトフロアブル テルスター水和剤・フロアブル トレボンEW・乳剤・水和剤 パーマチオン水和剤 バイスロイドEW ハクサップ水和剤 フォーース粒剤 ペイオフME液剤 マブリックEW・水和剤20 マブリックナック水和剤 ロディー水和剤・乳剤	水稲以外の作物	蚕児 魚介類	指定地域以外では使用しないこと。 (別表3)
		MR. ジョーカーEW・水和剤 <sup>1)</sup>			
		ロビンフッド			蚕児
IGR剤 <sup>2)</sup>	アフームエクセラ顆粒水和剤 アタブロンSC アタブロン乳剤 カスケード乳剤 デミリン水和剤 ノーモルト乳剤 ファルコンフロアブル マツチ乳剤 マトリックフロアブル ラノーテープ ロムダンフロアブル	野菜 果樹 花き たばこ 茶	蚕児	指定地域以外では使用しないこと。 ラノーテープは、蚕に対して長期間強い毒性があるので、IGR剤指定地域かつ桑園から1km以上離れたところで使うこと。 (別表3)	
BT剤 (生菌)	エスマルクDF サブリーナフロアブル ゼンターリ顆粒水和剤 チューンアップ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 バイオマックスDF バシレックス水和剤 ファイブスター顆粒水和剤 フローバックDF	野菜 花き たばこ 普通作物 果樹 茶	蚕児	指定地域以外では使用しないこと。 (別表4)	

(注) 上記銘柄と同一成分を含有する単剤及び混合剤を含む。

1) 合成ピレスロイド類似化合物

2) アブロード剤は除く(蚕毒が弱いため)。ただし、本表の上記銘柄と同一成分を含有する混合剤は指定地域以外では使用しない。

※本表の「該当銘柄名」は、この防除基準に掲載されている農薬名である。