

## 2. 主要農薬の蚕児に対する中毒型の分類

- 印は該当する項目  
 ◎印はそのうちでも強い農薬  
 ※印は特に注意を必要とする農薬

### 殺菌剤

農薬名	基準分類 蚕児の症状		中毒型						殺虫力				残留毒性		
			急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3～7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		短期で 消失する。
			強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
アミスター							○				○		○		
アリエッティC							○				○			○	
アントラコール				○				○				○		○	
アンビル								○			○			○	
イオウ								○			○			○	
インダー								○		○				○	
エムダイファー				◎※						◎※			◎※		
オリゼメート								○			○			○	
カスミン								○			○			○	
カスラブサイド								○			○			○	
カーゼートPZ							○				○			○	
キノンドー				○						○			○		
キンセット						○				○			○		
ゲッタ								○			○			○	
コラトツプ								○			○			○	
コロナ								○			○			○	
サプロール								○			○			○	
サンヨール								○			○			○	
ジマンダイセン				◎※						◎※			◎※		
スコア								○			○			○	
スターナー								○			○			○	
ストロビー								○			○			○	
スパットサイド								○			○			○	
スミブレンド								○			○			○	
スミレックス								○			○			○	
Zボルドー						◎				◎			◎		
ダコニール1000								○			○			○	
ダコレックス								○			○			○	
ダコレート								○			○			○	
デラ		○						○						○	
ドイツボルドーA						◎※				◎※			◎※		
トップジンM								○			○			○	
ネビジン								○			○			○	
バシタック				◎				◎				◎※		○	
パスポート								○			○			○	
パスワード								○			○			○	

基準分類 蚕児の症状 農薬名	中毒型						殺虫力				残留毒性		短期で消失する。
	急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3～7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
バリダシン						○				○			○
ビーム						○				○			○
フジワシ						○				○			○
ブルピカ						○				○			○
フロサイド						○				○		○	
ベフラント			◎							◎		◎	
ベルクト						◎				◎		◎	
ベンレート			○									○	
ベンレートT						○				○			○
ボルドー					○					○		○	
ホライズン										○		○	
ポリオキシンAL						○				○			○
ポリオキシンZ						○				○			○
マネージン						○				○			○
モレスタン						○				○			○
モンカット			◎							◎		◎	
モンセレン						○				○			○
ラブサイド			○				○					○	
ラリール						○				○			○
リゾレックス						○				○			○
ロブラール						○				○			○

殺虫剤

農薬名	基準分類 蚕児の症状	中毒型						殺虫力				残留毒性		
		急性型 1時間以内に 中毒症状を 現す。		亜急性型 2日以内に中 毒症状を現 す。		慢性型 3~7日後に 中毒症状を 現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		短期で 消失する。
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
ア ー デ ン ト	◎※						◎※					◎※		
ア グ ロ ス リ ン	◎※						◎※					◎※		
ア タ ブ ロ ン			◎※						◎※				◎※	
ア デ イ オ ン	◎※						◎※					◎※		
ア ド マ イ ヤ ー ム					◎※				◎※				◎※	
ア フ ァ ー ム					◎※				◎※				◎※	
ア プ ロ ー ド				○						○				○
エ ル サ ー ド	◎						◎					◎		
オ マ イ ト										○				○
オ リ オ ン	◎※						◎※					◎※		
オ ン コ ル	◎※	○					◎※			○		◎※		○
カ ス ケ ー ド					◎※				◎※				◎※	○
カ ネ マ イ ト			◎※			○			◎		○		◎※	○
カ ル ホ ス							◎※		◎			◎※		
ガ ッ ト サ イ ド S	◎※						◎※					◎※		
コ テ ツ					◎					◎			◎	
コ ロ マ イ ト				◎※			◎※					◎※		
サ イ ア ノ ッ ク ス				◎				○						○
サ ッ チ ュ ー コ ー ト S	◎※						◎※					◎※		
サ ン マ イ ト			◎						◎				◎	
ス ピ ノ エ ー ス					◎※				◎※				◎※	
ス ミ チ オ ン	◎						◎					◎		
ス ミ バ ッ サ			○				○							○
ゼ ン タ ー サ			◎※						◎※					○
ダ ー ズ バ ン	◎						◎					◎		
ダ イ ア ジ ノ ン	◎						◎					◎		
チ エ ト ス						○			◎※	○				
ダ ニ ト ロ ン					◎					◎			◎	
チ ュ ー リ サ イ ド			◎※						◎※				◎※	
デ イ プ テ レ ッ ク ス	◎						◎					○		
デ ミ リ ン			◎※						◎※				◎※	
ト ア ロ ー C T			○				○						○	
ト ク チ オ ン			◎				◎							○
ト ラ サ イ ド A	◎※						◎※					◎※		
ト レ ボ ン	◎※						◎※					◎※		
ノ ー モ ル ト			◎※						◎※				◎※	
バ イ オ セ ー フ			○				○							○
ハ ク サ ッ プ	◎※						◎※					◎※		
バ シ レ ッ ク ス					◎※				◎※				◎※	
パ ー マ チ オ ン	◎※						◎※					◎※		
バ ロ ッ ク					◎※				◎※				◎※	
バ リ ア ー ド	◎※													
ピ ラ ニ カ						○				○			○	
フ オ ー ス	◎						◎					◎		
ベ ス ト ガ ー ド						○				○				○

農薬名	基準分類		中毒型						殺虫力				残留毒性		短期で消失する。
	蚕児の症状		急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3～7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
ベ ジ ホ ン マ イ ト ク リ ー ン マ イ ト コ ー ネ マ ト リ ッ ク マ ラ ソ ン ミ ク ロ デ ナ ポ ン モ ス ピ ラ ン ラ ン ネ ー ト ロ ム ダ ン	◎※			◎					◎※		◎		◎※	◎	
			◎※					◎※			○		◎※		○
	○			◎				○			○		○		
	◎※			○				◎※			○		◎※		○
		◎						◎						○	
			◎※							◎※			◎※		◎※

### 除草剤

農薬名	基準分類		中毒型						殺虫力				残留毒性		短期で消失する。
	蚕児の症状		急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3～7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。		
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
ソ ル ネ ッ ト						○					○				○

### 【注意事項】

\*：既に登録は失効しているが、登録失効から1年以内の場合に限り、参考として掲載した。  
注) 残留性から推定される安全日数は、次項以降の表を参照する。