

51. せんぶり

・殺菌剤

FRACコード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11	アミスター20フロアブル	散布	収穫7日前まで	3回以内	
NC+M1	ジーファイン水和剤	散布	収穫前日まで	-	
M5	ダコニール1000	散布	収穫7日前まで	12回以内 (但し、1年間に6回以内)	
1	ベンレート水和剤	散布	収穫前日まで	12回以内 (但し、1年間に6回以内)	

・殺虫剤

IRACコード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
6	コロマイト乳剤	散布	収穫7日前まで	1回	
21	サンマイトフロアブル	散布	収穫75日前まで	1回	

- 注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。
- 注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。
- 注3) 使用回数は栽培期間内での回数であり、播種から収穫までの総使用回数なので、間違えないように注意する。
- 注4) 蚕毒・魚毒については、「56. 野菜類の総括注意」も参照する。

病害虫名 (F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体)

病害虫名	防除時期	防除方法	注意事項
さび病 (F)	5月～9月	1. ジーファイン水和剤、ダコニール1000の1,000倍液、アミスター20フロアブル、ベンレート水和剤の2,000倍液のいずれかを散布する。	1. 発病前から予防的に散布する。 2. QoI剤に関する注意事項「56. 野菜類の総括注意」参照。
シクラメン ホコリダニ	生育期間	1. コロマイト乳剤、又はサンマイトフロアブルの1,000倍液を散布する。	1. 発生初期に散布する。 2. コロマイトは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。