


R8　ぶどう「シャインマスカット」熟度調査結果


箕輪町大出（770m）　　上伊那農業農村支援センター

調査年	調査日	糖度(Brix%)		酸度(%)		果粒重(ｸﾞﾗﾑ)		果皮色(ｶﾗｰﾁｬｰﾄ指数)		食味(指数)		備考
		上部	下部	上部	下部	上部	下部	上部	下部	上部	下部	
R8	8月19日	16.3	16.9	0.75	0.81	10.0	10.6	1.6	1.5	1.2	1.1	
	8月26日	16.9	16.8	0.58	0.55	11.2	11.7	2.6	2.4	2.1	1.7	
	9月2日	16.9	16.3	0.47	0.49	11.4	12.3	2.9	2.0	2.3	1.8	
	9月9日	16.8	17.0	0.41	0.37	12.2	13.1	2.4	1.9	2.3	2.1	マスカット香を感じる
	9月16日	18.0	18.0	0.36	0.36	13.1	12.4	2.6	2.6	2.7	2.7	
	9月24日	19.0	19.7	0.34	0.34	12.6	12.2	3.5	3.3	3.3	2.9	
	9月30日	19.6	19.7	0.282	0.3572	12.56	12.9	4.1	4.1	3.2	2.8	
R7	8月21日	13.3	14.5	0.97	0.74	10.4	12.3	2.1	1.9	1.0	1.3	
	8月26日	16.5	16.2	0.67	0.58	11.7	13.1	2.8	2.7	2.0	1.8	
	9月2日	17.2	17.2	0.57	0.58	12.0	12.8	2.6	2.8	2.3	2.0	下部にて縮果症みられた
	9月9日	18.1	18.2	0.63	0.61	11.2	13.0	2.3	2.9	2.5	2.0	縮果症の粒がみられる
	9月16日	18.7	18.0	0.41	0.44	12.1	12.3	3.6	3.8	3.6	3.3	カスリ症がみられ始めた
	9月23日	20.3	20.0	0.48	0.50	14.2	13.6	3.9	3.3	3.6	3.6	カスリ症が見らえる
	9月30日	21.0	20.6	0.52	0.44	12.3	12.4	4.2	4.2	3.4	3.3	高糖度で食味良好
R6	8月20日	13.5	14.2	0.83	0.79	14.7	13.7	2.2	2.1	1.9	1.6	
	8月27日	14.6	14.9	0.54	0.57	14.5	13.6	2.6	1.9	2.1	2.0	
	9月3日	15.9	15.7	0.29	0.42	16.8	16.3	3.4	2.5	2.1	2.0	
	9月10日	16.6	16.8	0.29	0.34	17.2	16.0	3.1	2.6	2.5	2.5	
	9月17日	16.7	17.3	0.28	0.39	16.2	14.9	4.1	3.1	2.7	2.6	
	9月24日	17.5	17.1	0.26	0.38	16.1	16.2	3.7	3.3	3.0	2.7	カスリ症が見られ始めてきた
	10月1日	18.4	17.7	0.09	0.22	16.9	14.6	3.7	3.3	3.0	2.7	カスリ症が見られる
	10月8日	16.4	16.4	0.27	0.29	16.9	16.8	4.1	4.2	3.2	3.0	カスリ症が見られる









「シャインマスカット」収穫基準
満開後日数：90日以上
「シャインマスカット」用カラーチャート値：果房の中で青みのある果粒で「3」以上
糖度：19%以上（果房の中で最も成熟が遅い果粒が18%以上）
酸度：0．2～0．3%、一粒重：12～14g、果皮色：黄緑色