

R8 りんご「秋映」熟度調査結果


宮田村駒ヶ原（750m）　　上伊那農業農村支援センター


調査年	調査日	満開後日数	糖度(%)	硬度(lb)			着色指数	果面ワックス	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数	酸度（2cc）	果重（ｸﾞﾗﾑ）
			平均	陽光面	陰光面	平均					
R8	8月26日	129	11.5	18.5	18.2	18.4	1.7	0.0	4.6	0.39	234.3
満開日	9月2日	136	13.2	15.6	15.1	15.4	1.8	0.0	3.2	0.39	285.2
4月19日	9月9日	143	12.6	15.7	15.1	15.4	2.3	0.1	2.1	0.37	272.4
	9月16日	150	12.4	14.2	13.5	13.8	3.0	0.0	2.6	0.59	300.0
	9月24日	158	12.4	14.6	14.0	14.3	4.1	0.4	2.9	0.30	333.3
R7	9月2日	130	11.4	19.5	18.3	18.9	1.6	0.0	4.6	0.49	218.1
満開日	9月9日	137	12.4	15.8	15.5	15.7	1.6	0.1	4.0	0.51	255.5
4月25日	9月16日	144	13.4	16.0	15.3	15.6	2.9	0.7	2.6	0.39	269.4
R6	9月3日	132	11.8	19.5	19.3	19.4	2.2	0.1	3.6	0.64	228.6
満開日	9月10日	139	11.9	16.8	16.2	16.5	2.1	0.2	4.0	0.42	237.9
4月24日	9月17日	146	12.6	13.5	12.8	13.2	2.7	0.2	2.9	0.47	287.1

＊硬度はﾏｸﾞﾈｽﾃｰﾗｰ硬度計7/16（針頭大）で測定
＊着色は　1：微、2：淡、3：中、4：濃
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数　1：完全消失、2：70%程度消失、3：維管束帯まで消失、4：果心内消失、5：完全染色
＊果面ワックス　0:無　1:少しベタベタするが商品性に影響なし　2:ベタベタする。商品性に影響あり　3:とてもベタベタし不快。商品性に影響大









「秋映」 収穫目安

満開後日数 ： 145～155日前後
果実重　　：300g
酸　　度　：0.4
糖　　度　： 14～15%程度