


R8　なし「幸水」熟度調査結果


中川村小平（580m）　　上伊那農業農村支援センター

調査年	調査日	満開後日数	糖度(%)	硬度(lb)			果皮色指数	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数	酸度(2cc)	食味指数	果重(ｸﾞﾗﾑ)
			平均	陽光面	陰光面	平均					
R8	7月29日	109	12.15	19.3	18.8	19.1	2.0	3.9	0.07	1.2	318.8
満開日	8月5日	116	12.8	14.7	17.2	16.0	2.0	2.3	0.05	1.6	407.0
4月11日	8月12日	123	12.9	13.0	13.6	13.3	2.1	2.9	0.04	2.0	438.0
	8月19日	130	13.8	13.6	14.5	14.1	2.2	1.9	0.05	3.1	537.7
	8月26日	137									
R7	8月5日	108	12.6	16.1	18.3	17.2	1.4	3.7	0.01	1.6	351.4
満開日	8月12日	115	12.8	12.6	14.2	13.4	2.0	1.9	0.02	2.2	413.6
4月19日	8月19日	122	12.5	12.2	13.7	12.9	2.0	2.0	0.01	2.2	513.1
R6	8月13日	119	12.0	9.7	10.2	10.0	1.0	1.9	0.01	2.6	365.0
満開日	8月20日	126	12.1	11.5	11.1	11.3	1.8	1.5	0.02	3.0	516.7
4月16日	8月27日	133	12.2	9.1	9.24	9.2	2.2	1.6	0.02	3.5	510.3









＊短果枝果実5果をランダムに採取
＊硬度はﾏｸﾞﾈｽﾃｰﾗｰ型硬度計（大針頭7/16）により計測
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応は、5：完全染色、4：80%染色、3：50%染色、2：30%染色、1：10%以下染色
＊果皮色は幸水用ｶﾗｰﾁｬｰﾄ使用
＊食味は1：まずい～3：ふつう～5：うまい

収穫期目安

満開後日数	120日
目標糖度（brix%）	12%以上
硬度（小針頭）	6～7ﾎﾟﾝﾄﾞ（南信試収穫データ）
果皮色	2．3～2．5
ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応	1．5～2．0（茨城指標）