


R8　なし「南水」熟度調査結果


中川村前沢洞（580m）　　上伊那農業農村支援センター


調査年	調査日	満開後日数	糖度(%)	硬度(lb)			果皮色指数	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数	食味指数	熟度指数	酸度(2cc)	果重(ｸﾞﾗﾑ)
			平均	陽光面	陰光面	平均						
R8 満開日 4月10日	8月19日	131	13.4	15.3	15.0	15.1	2.0	4.8	1.4	1.5	0.08	426.6
	8月26日	138	12.7	12.6	13.2	12.9	2.2	4.0	1.3	1.4	0.08	430.2
	9月2日	145	13.9	11.8	10.4	11.1	2.4	4.9	1.7	1.6	0.08	421.0
	9月9日	152	14.2	9.9	9.6	9.7	2.4	2.3	2.8	2.9	0.11	638.2
	9月16日	159										
R7 満開日 4月18日	8月21日	125	11.9	11.8	12.6	12.2	2.4	4.1	1.0	1.0	0.02	357.5
	8月26日	130	11.6	12.6	12.0	12.3	2.1	4.0	1.7	2.0	0.02	350.5
	9月2日	137	12.6	12.4	11.8	12.1	2.4	2.7	2.6	2.5	0.01	421.0
	9月9日	144	12.9	9.8	10.0	9.9	2.4	3.8	2.3	2.8	0.03	461.6
	9月16日	151	12.8	9.8	9.2	9.5	2.5	1.9	2.7	3.1	0.02	487.3
R6 満開日 4月16日	8月13日	119	12.3	15.7	14.3	15.0	2.0	4.7	2.0	2.0	0.02	317.2
	8月20日	126	12.4	13.9	12.2	13.1	2.2	4.5	2.0	2.0	0.02	376.5
	8月27日	133	12.5	11.0	10.9	11.0	2.4	3.9	3.1	3.0	0.01	421.0
	9月3日	140	12.6	11.5	10.3	10.9	2.4	2.2	2.8	2.9	0.01	470.5
	9月10日	147	13.2	9.6	9.5	9.5	2.5	2.4	3.5	3.2	0.01	572.2











収穫期目安

満開後日数	155日
目標糖度(brix%)	14%以上
硬度(小針頭)	5～6ﾎﾟﾝﾄﾞ
果皮色	2．5(長期貯蔵2．3)
ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応	

＊H23より調査地点変更,H30より調査樹を変更
＊硬度はﾏｸﾞﾈｽﾃｰﾗｰ型硬度計(太針頭5/16)により計測
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応は、5:完全染色、4:80%染色、3:50%染色、2:30%染色、1:10%以下染色
＊地色は南水用ｶﾗｰﾁｬｰﾄ使用
＊食味は1:まずい～3:ふつう～5:うまい