


R8 りんご「シナノリップ」熟度調査結果


中川村葛島（650m）　　上伊那農業農村支援センター

調査年	調査日	満開後日数	糖度(%)	硬度(lb)			着色程度	ふじ地色チャート	果樹試チャート	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応	食味	熟度	酸度(2cc)	果重(ｸﾞﾗﾑ)	備考
			平均	陽光面	陰光面	平均									
R8	7月1日	78	11.2	21.1	20.4	20.8	1.4	1.0	2.0	4.2	1.0	1.0	0.91	152.1	
満開日	7月8日	85	12.3	18.3	18.3	18.3	1.6	1.3	2.3	3.5	1.7	1.8	0.66	194.5	
4月14日	7月15日	92	11.9	18.5	17.0	17.8	1.9	1.7	2.8	3.4	1.8	1.7	0.60	203.3	7/12多目的ネット設置
	7月22日	99	12.6	18.4	16.4	17.4	2.0	2.0	2.8	3.5	1.8	1.8	0.50	222.0	
	7月29日	106	13.2	16.9	15.1	16.0	2.4	1.9	3.2	3.3	1.9	2.0	0.39	251.9	
R7	7月16日	88	11.1	17.6	16.1	16.8	1.7	1.4	2.2	2.6	1.5	1.1	0.51	206.7	デンプンの抜けが早い
満開日	7月22日	94	11.5	15.1	14.0	14.6	1.7	2.0	2.0	3.2	2.0	1.0	0.59	241.3	
4月19日	7月29日	101	11.9	12.8	12.5	12.6	2.4	2.4	3.6	1.9	2.0	2.1	0.34	263.9	
	8月5日	108	12.7	12.3	11.3	11.8	3.7	4.6	4.6	1.3	2.8	3.9	0.33	301.5	硬度が下がっている
R6	7月16日	93	11.4	14.8	14.7	14.7	2.0	2.2	2.1	2.9	1.6	1.7	0.52	221.8	心かびなし
満開日	7月23日	100	12.3	14.9	14.2	14.6	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	1.9	0.70	262.8	心かびなし
4月14日	7月30日	107	12.4	13.7	12.3	13.0	4.9	2.7	3.6	2.1	2.3	2.7	0.50	258.0	心かびあり
	8月6日	114	11.6	12.4	12.8	12.6	3.1	2.6	3.9	2.0	2.6	3.2	0.49	343.6	









＊目通りの中庸な果実5果をランダムに採取
＊硬度はペネトロメータ硬度計（小針頭7/16）により計測
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応は、5：完全染色、4：80%染色、3：50%染色、2：30%染色、1：10%以下染色
＊地色はふじ用ｶﾗｰﾁｬｰﾄ使用　　＊食味は1：まずい～3：ふつう～5：うまい

収穫期目安

満開後日数	100～110日
目標糖度（brix%）	14～15%
酸度	0.4%