

R8　りんご「つがる」熟度調査結果


宮田村駒ヶ原（700m）　　上伊那農業農村支援センター


調査年	調査日	満開後日数	糖度(%)	硬度(lb)			着色指数	地色	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数	酸度	果重
			平均	陽光面	陰光面	平均				(2cc)	(ｸﾞﾗﾑ)
R8	7月29日	102	11.1	16.3	15.8	16.1	1.4	1.0	5.0	0.27	220.6
満開日	8月5日	109	13.0	13.7	14.8	14.3	1.4	1.3	4.1	0.28	218.8
4月18日	8月12日	116	13.0	14.3	14.9	14.6	1.7	2.0	3.4	0.27	225.7
	8月19日	123	13.0	14.6	14.6	14.6	2.6	2.0	3.6	0.22	280.9
	8月26日	130	13.1	12.2	12.3	12.2	2.6	2.4	2.7	0.18	281.4
R7	8月5日	104	10.7	17.1	14.9	16.0	1.4	1.8	5.0	0.27	202.6
満開日	8月12日	111	9.6	15.6	14.8	15.2	1.6	1.5	3.1	0.31	224.2
4月23日	8月19日	118	12.3	13.0	13.2	13.1	2.3	3.0	4.1	0.25	262.8
R6	8月6日	102	8.9	15.4	15.8	15.6	1.1	1.2	4.5	0.32	252.0
満開日	8月13日	109	10.3	10.9	11.0	11.0	1.4	2.4	4.0	0.28	270.2
4月26日	8月20日	116	11.7	15.3	14.7	15.0	1.4	2.3	3.7	0.50	285.6

＊硬度はﾏｸﾞﾈｽﾃｰﾗｰ硬度計7/16（針頭大）で測定
＊着色は　1：微、2：淡、3：中、4：濃
＊ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応指数　1：完全消失、2：70%程度消失、3：維管束帯まで消失、4：果心内消失、5：完全染色
＊平成28年より、調査樹を変更









※R8.8.19は収穫中であったことから、やや青みの残る果実を調査した。

「つがる」収穫期の目安
満開後日数：115～125日
糖　　度：13%以上
ﾖｰﾄﾞ･ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ反応：3程度
果実硬度：13ﾎﾟﾝﾄﾞ以上