


リンゴ黒星病 子のう胞子の初飛散日(予測)

観測地点:飯綱町倉井
2025年4月24日現在

3/1からの有効積算気温が180℃を超えた日で、
かつ日平均気温が10℃を超え、一旦気温が下降して、
「再度10℃を超えた降雨のある日」に初飛散するとされています。



観測場所	標高	3/1からの 積算気温(℃)	180℃到達日	日平均気温 10℃越えた日	日平均気温 再度下降した日	推定 初飛散日
飯綱町倉井	530m	348.1	4月8日	4月11日	4月12日	4月20日

展葉期
4月17日


コメント

4月8日に積算気温が180℃を超えました。(R6: 4月9日に180℃到達)
4月20日に推定初期飛散日となりました、防除時期を逸しないように注意してください。

リンゴ黒星病 子のう胞子の初飛散日(予測)

観測地点:長野市城山
2025年4月24日現在

3/1からの有効積算気温が180℃を超えた日で、
かつ日平均気温が10℃を超え、一旦気温が下降して、
「再度10℃を超えた降雨のある日」に初飛散するとされています。



観測場所	標高	3/1からの 積算気温(°C)	180°C到達日	日平均気温 10°C越えた日	日平均気温 再度下降した日	推定 初飛散日
長野市城山	420m	445.5	3月31日	4月2日	4月3日	4月10日

展葉期	←長野県果樹試験場(須坂市) 「ふじ」にて
4月9日	

コメント

3月31日に有効積算温度が180℃に到達しました。(R6:4月6日)
飛散条件をみたしているので、防除時期を逸しないように注意してください。