

## 台風第3号接近に伴う技術対策について

平成29年(2017年)7月4日

農業技術課

### 1 共通

- (1) 気象情報に十分留意するとともに、ほ場の排水が速やかに行われるよう、ほ場の周辺や排水路の点検を特に滞水しやすいほ場を中心に行う。ただし、風雨が強かったり河川や水路が増水し、危険が予想される場合は、避ける。
- (2) 冠水しやすい場所では、事前に機械類等を移動しておく。
- (3) 突風に備えて、果樹や野菜・花き類の支柱、施設・温室の外周りなどを点検・補強する。特に、傷んでいる箇所や力が大きくかかる箇所に注意する。また、作業は複数人で行う。
- (4) 台風通過後の対策で農薬散布を行う際には、最新の使用基準を遵守する。

### 2 園芸・農業用施設全般

- (1) 強風に備えて、ハウスや畜舎及び堆肥施設等の破損部の修理、支柱・筋交い等の補強を行う。特にパイプハウスは強風による被害を受けやすいので、ハウスやフィルムが飛ばされないよう、らせん杭の設置やフィルム押さえバンド、フィルム留め具等の点検を行っておく。また、収穫物がある施設では、周囲に排水溝を設け、冠水を防ぐ。
- (2) サイドフィルムのあるパイプハウスでは、サイドフィルムを下ろし、妻部分もフィルムで覆ってすきま風が入らないようにする。ただし日中気温の高い状態では、風下妻面のみを開放し、台風通過後、速やかにハウス内を換気する。
- (3) 雨よけ施設では、状況に応じてフィルムの巻き上げを行い、施設の損壊を防ぐ。
- (4) 収穫終了後など使用していないハウスは、被覆資材（フィルムやネット等）を取り外す。
- (5) 倒壊が心配される場合の最終手段として被覆フィルムを切り裂き、風圧を軽減する手段を検討する。ただし、強風の中の作業は大変危険なので、安全性に十分配慮して作業を行う。
- (6) 防鳥ネット、防雹ネット、日焼け防止ネット（寒冷紗）設置園では、強風で飛ばされないようネットの巻き取りや除去を行う。

### 3 水稲

- (1) 事前に排水路の詰まり等の点検・補修を行い、冠水時の速やかな排水に備える。
- (2) 冠水した場合は速やかな排水に努めるとともに、排水後はいもち病、白葉枯病の発生に注意し、適切に防除する。

### 4 麦

収穫直前の麦では、倒伏や穂発芽の発生などにより、品質の低下が懸念されるので、可能な限り降雨の前に収穫作業を行うとともに、被害麦については、仕分けを行ったうえで、それぞれ乾燥、調製作業を実施する。

### 5 大豆

浸水・冠水した場合は、直ちに排水する。また、病虫害の発生に注意し、適切に防除する。

### 6 立木果樹（りんご、もも、プラム、プルーン、おうとう等）

- (1) 樹の倒伏・折損を防ぐために、防風ネットの展張と点検、支柱の追加、主枝の固定等を行う。腐らん病や虫害発生箇所等の障害部は折れやすいので、しっかり固定する。
- (2) 3～6年生程度の若木は倒伏しやすいので、主幹部に支柱を添えたり、トレリスの固定を確

- 認する。特に苗木は倒伏しやすいので、支柱にしっかり固定する。
- (3) トレリスは構造を確認し、必要に応じて、アンカーを追加しての引き張り線の設置や支柱上部の連結により補強する。
  - (4) 袋かけの最中の果樹類は、落果を避けるため台風が通過して風がおさまるまで袋かけを延期する。また、必要に応じて袋かけ前に防除を行う。
  - (5) 収穫直前のもも、プラム、あんず等の果実については、JAや集出荷業者等と十分協議のうえ、収穫可能な品質に達している果実を収穫する。なお、収穫に当たっては農薬使用基準（収穫前日数）を遵守するとともに、未熟果を収穫しないようにする。
  - (6) 高接ぎを行った樹では、強風で接木部や新梢が折損しないよう、添え竹に結束する。

## 7 棚果樹（なし、ぶどう等）

- (1) 棚の周囲に防風ネット等を張り、風による果実の落果や枝の損傷を防ぐ。
- (2) 棚の上下動に伴う枝の損傷や落果を防ぐために、アンカーの補強、棚線の締め直し、ゆるんだ誘引部の補強等を行う。特にAマストの棚は、強風により棚全体が上下動しやすいため、アンカーと引き張り線による補強を徹底する。
- (3) ぶどうでは、こまめに新梢誘引を行い、房が風で振られないようにする。
- (4) 高接ぎを行った樹では、強風で接木部や新梢が折損しないよう、亜主枝候補など重要な場所ではできるだけ誘引ひもで振れ止めの処理を行う。

## 8 野菜、花き（露地栽培）

- (1) 露地のきゅうり、アスパラガス、ながいも、花き類（きく、りんどう、ゆり等）などは支柱の補強やフラワーネットの補修を行い、強風による倒伏と茎葉等の損傷を防ぐ。
- (2) 滞水しやすいほ場では、畑の周囲へ排水溝を設置して早期排水に努める。
- (3) 滞水が続いた場合は、液肥の葉面散布を行い草勢の回復を図る。
- (4) 強風や雨により病害が発生しないよう、台風通過後は風がおさまるのを待って、速やかに殺菌剤の散布を行う。
- (5) スイートコーンは、雌穂絹糸抽出期で倒伏した場合、不受精による変形果の発生が懸念されるので、根を傷めないよう早めに起こす。
- (6) きく、りんどう、ゆり、グラジオラス等が倒伏した場合は、早めに茎葉を起こし、茎の曲がりを防ぐ。

## 9 畜産

- (1) 畜舎周辺を点検し、雨水の流入、浸水等がないように周囲に排水溝を設ける。
- (2) ハウス畜舎、堆肥舎は破損部の補修、支柱・筋交い等の補強により倒壊を防ぐ。特に強風によりフィルムが飛ばされないようフィルム押さえバンドを点検する。
- (3) 停電に備え、搾乳機やバルククーラーの電源を確保する自家発電機の点検を行うとともに、不足する発電機の手配をJA等関係団体と連携をとり対応する。

## 10 菌茸

- (1) 停電が発生し室温と外気温の差が大きい場合は、短時間であればドアの開閉を控える。
- (2) 停電が長時間に渡る場合は、施設内の温度上昇に留意して適宜、換気を行う。
- (3) 施設が浸水した場合は、次の対策を行う。
  - ・電気設備は、起動前に十分な点検を行い、漏電事故が発生しないよう注意する。
  - ・収穫できるものは、早めに収穫、包装する。
  - ・生育中、水がかかった生産物は速やかに施設外へ搬出し、処分する。

- ・室内の浄化を図るため、施設を空にして水で泥等を洗浄する。
- (4) 洗浄後は、除菌剤（0.1～0.05%次亜塩素酸ナトリウム）を散布し、乾燥する。  
オゾンガス発生装置がある場合は、オゾン処理方法に従って除菌する。
- (5) 次亜塩素酸ナトリウム散布後は、十分換気してから培養基を搬入する。（直後の搬入は避ける。）

## 11 鳥獣害対策

- (1) 広域防護柵、簡易電気柵を点検し、支柱の補強・通電線の張りの調整を行う。
- (2) 台風通過後、倒木等による破損や漏電が確認された場合は、速やかに修繕する。