

# 農業試験場水稻試験圃の生育状況(令和7年)

農業試験場八重森圃場(標高334m)

調査時期	調査項目	あきたこまち				コシヒカリ				風さやか			
		前年 (R6)	平年	本年 (R7)	平年差	前年 (R6)	平年	本年 (R7)	平年差	前年 (R6)	平年	本年 (R7)	平年差
20日	移植後 主稈葉数 (枚)	6.4	6.5	6.4	-0.1	6.4	6.6	6.2	-0.4	6.3	6.4	6.0	-0.4
	草丈 (cm)	28	27	28	106%	29	31	31	100%	27	29	29	101%
	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	187	200	111	55%	194	205	119	58%	229	214	185	87%
30日	移植後 主稈葉数 (枚)	8.1	8.4	8.3	0.0	8.2	8.1	8.2	0.0	8.2	8.2	8.0	-0.2
	草丈 (cm)	37	35	37	103%	40	37	40	108%	35	34	37	109%
	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	433	457	403	88%	475	434	360	83%	543	506	440	87%
40日	移植後 主稈葉数 (枚)	9.3	9.7	10.3	0.5	9.4	9.7	10.2	0.5	9.4	9.7	10.2	0.4
	草丈 (cm)	52	52	57	109%	54	50	58	116%	46	44	52	120%
	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	596	614	695	113%	649	633	709	112%	728	720	775	108%
幼穂形成期	期日 (月日)	7/7	7/6	7/7	+1	7/11	7/12	7/13	+1	7/14	7/17	7/14	-3
出穂期	期日 (月日)	7/25	7/26	7/25	-1	8/3	8/4	8/3	-1	8/6	8/8	8/5	-3
成熟期	期日 (月日)	9/1	9/5	9/2	-3	9/9	9/14	9/8	-6	9/14	9/21	9/14	-7
	稈長 (cm)	85	87	85	98%	98	95	101	106%	81	82	83	101%
	穂長 (cm)	19.8	18.8	18.4	98%	19.1	18.6	18.4	99%	18.1	17.2	16.9	98%
	穂数 (本/m <sup>2</sup> )	440	484	471	97%	431	495	478	97%	416	458	449	98%
	玄米重 (kg/a)	63.4	65.0			57.8	62.4			67.8	71.1		
	千粒重 (g)	22.1	21.8			22.0	21.5			22.7	22.4		
	総粒数 (粒/m <sup>2</sup> )	35,585	38,468			33,339	42,442			36,344	42,249		
	登熟歩合 (%)	86.7	82.2			82.4	76.3			84.8	77.0		
	登熟粒数 (粒/m <sup>2</sup> )	30,852	31,302			27,471	32,234			30,819	32,396		

平年値は平成30年～令和6年の収量の最大、最小年を除く7中5年の値。

移植日:令和7年5月20日、苗質:中苗、移植法:1株3本手植え、栽植密度:22.2株/m<sup>2</sup>(30cm×15cm)

苗丈(cm)および葉齡(L):「あきたこまち」20.8 3.1 「コシヒカリ」23.1 2.8 「風さやか」18.7 2.2

<概要>

**移植後20日の生育** 主稈葉数は3品種ともにほぼ平年並。草丈は平年より長く、茎数は平年より少なかった。移植時は高温であったが、その後低温寡照の期間が続いたことから活着が遅れたためと考えられる。

**移植後30日の生育** 主稈葉数は「あきたこまち」で平年よりやや多く、「コシヒカリ」「風さやか」でほぼ平年並みとなつた。草丈は3品種とも平年よりやや長い。茎数はいずれも平年より少ないが、特に「あきたこまち」「コシヒカリ」では回復傾向にある。これは6/13以降の高温により、分げつ発生が促されたことによると考えられた。

**移植後40日の生育** 主稈葉数、草丈、茎数とも、3品種全てが前回調査と比較して急激に増加して平年を上回った。この期間はかなりの高温傾向であり、非常に生育が旺盛であった。

**幼穂形成期** 平年に比べ「あきたこまち」「コシヒカリ」は1日遅く、「風さやか」は3日早かった。

**出穂期** 平年に比べ「あきたこまち」と「コシヒカリ」で1日早く、「風さやか」で3日早かった。

**成熟期** 平年に比べ「あきたこまち」で3日、「コシヒカリ」で6日、「風さやか」で7日早かった。稈長は「あきたこまち」で平年並み、「コシヒカリ」「風さやか」でやや長かった。穂長は「あきたこまち」で同等、「コシヒカリ」「風さやか」でやや短かった。穂数はすべての品種でほぼ同等であった。

