

- ・ 2026/9/2日現在「平均気温が平年＋1℃で経過した場合」の成熟期及び刈り取り時期の予測です。
- ・ 出穂期とは、穂の先端が葉鞘から出たものが、水田全体のおおむね50%となった時期です。
- ・ このデータは飯田測候所(標高516m)の平均気温を基に算出しているため、標高が異なる場合は日数が前後します。
- ・ 出穂期とは、穂の先端が葉鞘から出たものが、水田全体のおおむね50%となった時期です。

出穂後20日間の平均気温が25℃以上になると白未熟粒が、出穂後10日間、日最高気温で30℃以上の日が多発すると胴割粒が増加します。夕方入水や、可能であればかけ流し(少量でも効果あり)を行い、高温障害対策を行いましょう。

帯緑色籾歩合による成熟期と収穫開始の判断・・・みどり色のモミが一つの穂に占める割合

帯緑色籾歩合： 30% → 収穫7～10日前頃
20% → 収穫5日前頃
10% → 収穫開始
5% → 成熟期
2% → 収穫終了

登熟積算温度による成熟期予測 ※（日数は目安とし、実際には帯緑色籾歩合で成熟期を確認してください。）

あきたこまち 登熟積算温度950℃		出 穂 期						
		7月15日	7月20日	7月25日	7月30日	8月4日	8月7日	8月10日
本年	刈取始め	8月14日	8月19日	8月25日	8月30日	9月5日	9月8日	9月12日
	成 熟 期	8月19日	8月24日	8月30日	9月4日	9月10日	9月13日	9月17日
	刈取終了	8月24日	8月29日	9月4日	9月9日	9月15日	9月18日	9月22日
平年成熟期		8月21日	8月26日	8月31日	9月5日	9月11日	9月14日	9月18日

コシヒカリ 登熟積算温度1000℃		出 穂 期						
		7月20日	7月25日	7月30日	8月4日	8月7日	8月10日	8月13日
本年	刈取始め	8月21日	8月27日	9月1日	9月7日	9月10日	9月14日	9月17日
	成 熟 期	8月26日	9月1日	9月6日	9月12日	9月15日	9月19日	9月22日
	刈取終了	8月31日	9月6日	9月11日	9月17日	9月20日	9月24日	9月27日
平年成熟期		8月28日	9月2日	9月7日	9月13日	9月17日	9月20日	9月24日

風さやか 登熟積算温度1100℃		出 穂 期						
		7月20日	7月25日	7月30日	8月4日	8月7日	8月10日	8月13日
本年	刈取始め	8月25日	8月31日	9月5日	9月11日	9月15日	9月19日	9月22日
	成 熟 期	8月30日	9月5日	9月10日	9月16日	9月20日	9月24日	9月27日
	刈取終了	9月4日	9月10日	9月15日	9月21日	9月25日	9月29日	10月2日
平年成熟期		9月1日	9月6日	9月12日	9月18日	9月22日	9月25日	9月30日

天竜乙女 登熟積算温度1070℃		出 穂 期					
		8月10日	8月13日	8月16日	8月19日	8月22日	8月25日
本年	刈取始め	9月17日	9月21日	9月24日	9月28日	10月3日	10月7日
	成 熟 期	9月22日	9月26日	9月29日	10月3日	10月8日	10月12日
	刈取終了	9月27日	10月1日	10月4日	10月8日	10月13日	10月17日
平年成熟期		9月24日	9月28日	10月2日	10月6日	10月11日	10月16日