






令和7年 市田柿熟度調査結果

市田柿ブランド推進協議会

調査地点: 高森町 標高400m台 3地点の平均

年	調査日	果重 (g)	果皮色(CC指数)			硬度(ポンド)			種子数	条紋	糖度(%)	
			果頂部	赤道部	肩部	果頂部	赤道部	肩部			果汁	タンニン除
R7	10月1日	93	1.9	1.6	1.2	12.1	13.8	14.6	0.2	0.6	19.0	13.6
	10月8日	110	3.1	2.4	1.9	9.4	10.7	13.0	0.8	2.1	19.3	15.3
	10月15日	110	4.0	3.2	2.4	8.1	8.8	10.3	0.1	2.2	20.6	16.2
	10月22日	116	4.3	3.7	3.1	7.2	8.1	9.0	0.3	2.9	21.2	18.0
	10月29日	117	5.1	4.6	3.7	5.9	7.5	8.2	0.4	3.3	21.1	19.4
	11月5日	113	5.0	4.8	4.4	5.9	5.9	7.3	0.1	4.0	19.6	16.3
R6	9月25日	88	1.2	1.2	1.0	13.9	14.3	15.7	0.0	0.6	18.8	13.4
	10月2日	98	2.2	1.8	1.4	12.8	13.8	14.9	0.2	0.9	19.1	14.4
	10月9日	111	3.0	2.3	1.6	9.8	10.8	12.6	0.6	1.4	19.4	15.8
	10月16日	122	4.0	3.5	2.9	7.3	7.9	9.4	0.4	2.6	19.8	17.2
	10月23日	123	4.3	3.5	3.0	8.4	8.6	9.4	0.3	2.8	20.3	18.2
	10月30日	134	5.5	4.9	4.0	6.3	7.2	8.1	0.4	3.5	21.9	19.1
R5	9月27日	84	1.4	1.3	0.9	13.1	13.9	15.5	0.2	0.2	19.3	13.6
	10月4日	92	2.5	2.0	1.4	12.2	13.4	14.4	0.2	0.5	19.6	14.7
	10月11日	100	3.7	2.9	2.4	10.5	11.5	12.1	0.1	1.6	19.8	15.5
	10月18日	109	4.5	3.8	3.2	8.1	8.4	9.7	0.2	1.6	20.4	17.4
	10月25日	113	4.5	4.1	3.8	6.6	7.7	8.7	0.4	2.2	20.9	17.9
	11月1日		調査終了									



* 調査果実: 10個(樹冠外周部の目通りの高さから採取)
 * 果皮色: 農水省カラーチャート(指数0~10)、着色の平均的部位を測定
 * 果肉硬度: R7; ペネトロメーター5/16インチ(小)使用
 ~ R6; マグネステレー式硬度計5/16インチ(小)使用
 * 条紋: 0(無) 2(少) 4(中) 6(多)

市田柿収穫の目安

タンニン除去後の糖度: 18%以上(通常の果汁で20%以上)
 果肉硬度: 5ポンド(5/16インチ頭針) 弾力が出てきたころ
 果皮色: 果頂部赤み強く、ヘタ部橙黄色(指数4以上)

コメント: 11月5日現在

※収穫済み園地があるため、11月5日のデータは参考値としてください。

・収穫期に入っている。

・条紋による果肉軟化が増加しているので、遅れないように収穫する。