






令和7年 市田柿熟度調査結果

市田柿ブランド推進協議会

調査地点: 高森町 標高500m台 3地点の平均

年	調査日	果重 (g)	果皮色(CC指数)			硬度(ポント)			種子数	条紋	糖度(%)	
			果頂部	赤道部	肩部	果頂部	赤道部	肩部			果汁	タンニン除
R7	10月1日	98	2.1	1.7	1.3	11.5	13.0	13.8	0.2	0.5	18.8	12.6
	10月8日	109	3.5	2.8	2.0	10.0	11.8	12.5	0.2	2.1	18.6	14.9
	10月15日	117	4.5	4.0	3.2	8.1	9.5	10.2	0.1	2.3	20.6	16.7
	10月22日											
	10月29日											
	11月5日											
R6	9月25日	96	1.4	1.2	1.0	13.7	14.3	15.9	0.5	0.6	18.3	12.8
	10月2日	107	2.1	1.8	1.4	12.7	14.7	14.6	0.1	0.7	18.0	13.2
	10月9日	112	3.3	2.5	1.7	9.3	10.1	11.6	0.0	1.7	18.1	14.5
	10月16日	127	3.8	3.1	2.6	8.0	9.1	10.3	0.0	2.5	18.6	14.9
	10月23日	128	4.3	3.7	3.0	7.0	8.5	9.3	0.2	3.4	20.3	17.6
	10月30日	139	5.1	4.6	3.8	5.8	6.7	7.9	0.1	3.8	20.7	18.2
R5	9月27日	81	1.6	1.1	0.8	13.7	14.2	15.2	0.2	0.1	19.3	13.1
	10月4日	90	2.3	1.6	0.9	11.8	13.0	14.0	0.1	0.3	19.0	14.5
	10月11日	99	3.7	2.7	2.2	10.2	11.4	12.4	0.2	1.0	19.5	15.0
	10月18日	108	4.6	3.8	3.2	7.8	8.9	10.4	0.1	1.2	20.0	16.2
	10月25日	112	4.4	3.8	3.6	6.8	8.5	10.0	0.4	2.0	20.4	16.7
	11月1日											

調査終了



* 調査果実: 10個(樹冠外周部の目通りの高さから採取)
 * 果皮色: 農水省カラーチャート(指数0~10)、着色の平均的的部位を測定
 * 果肉硬度: R7; ペネトロメーター5/16インチ(小)使用
 ~R6; マグネステラー式硬度計5/16インチ(小)使用
 * 条紋: 0(無) 2(少) 4(中) 6(多)

市田柿収穫の目安

タンニン除去後の糖度: 18%以上(通常の果汁で20%以上)
 果肉硬度: 5ポント(5/16インチ頭針) 弾力が出てきたころ
 果皮色: 果頂部赤み強く、ヘタ部橙黄色(指数4以上)
 ヘタ: 青味が抜け黄色になりそり返る

コメント: 10月15日現在

- ・果皮色は、昨年よりやや高かった。
- ・果肉硬度は、昨年並みであった。
- ・タンニン除去後の糖度は、昨年より高かった。
- ・条紋の程度は、昨年並みであった。
- ・500m台の収穫開始目安は、11月1日頃からと考えられる。

7