

様式 1－4－2 号

化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表（女性）

女性 〔治療による早発卵巣不全（POI）リスク〕		POIリスク 「低」		POIリスク 「中」		POIリスク 「高」						
化学療法	Cyclophosphamide equivalent dose (CED)		☐ # <4,000 mg/m ²		☐ # 4,000～8,000 mg/m ²		☐ # >8,000 mg/m ²					
			思春期前（月経未発来）の場合には以下の範囲となる。初経後しばらくは明確な線引きが困難									
			☐ # <8,000 mg/m ²		☐ # 8,000～12,000 mg/m ²		☐ # >12,000 mg/m ²					
	薬剤別	アルキル化薬	CEDの項で該当か所にチェックすること。									
		白金製剤					☐ # CDDP<600 mg/m ² ☐ # CBDCA		☐ # CDDP>600 mg/m ²			
		代謝拮抗薬	☐ # Ara-C ☐ # GEM	☐ # MTX ☐ # 6-MP								
		ビンカアルカロイド	☐ # VCR									
		モノクローナル抗体	☐ # Bmab									
		レジメン別	AC/EC±タキサン	☐ # AC×4サイクル (40歳未満)		☐ # AC×4サイクル (40歳以上)						
	☐ # AC/EC×4サイクル +タキサン (35歳未満)			☐ # AC/EC×4サイクル +タキサン (35歳以上)								
				☐ # (F)EC×4サイクル + dose dense タキサン								
	CMF, CEF, CAF, TAC		☐ # CMF ☐ # CEF ☐ # CAF ☐ # TAC	6サイクル (30歳未満)		☐ # CMF ☐ # CEF ☐ # CAF ☐ # TAC	6サイクル (30～39歳)		☐ # CMF ☐ # CEF ☐ # CAF ☐ # TAC	6サイクル (40歳以上)		
	FOLFOX		☐ # FOLFOX (40歳未満)		☐ # FOLFOX (40歳以上)							
	Escalated BEACOPP		☐ # Escalated BEACOPP 2サイクル		☐ # Escalated BEACOPP 6-8サイクル (30歳未満)		☐ # Escalated BEACOPP 6-8サイクル (30歳以上)					
	CHOP		☐ # CHOP 6サイクル (35歳未満)		☐ # CHOP 6サイクル (35歳以上)							
	Dose-adjusted EPOCH		☐ # Dose-adjusted EPOCH 6サイクル (35歳未満)		☐ # Dose-adjusted EPOCH 6サイクル (35歳以上)							
	その他		☐ # ABVD ☐ # CVP									
			☐ # BEP ☐ # EP (30歳未満)									
	疾患別治療			☐ # 急性骨髄性白血病治療 ☐ # 急性リンパ性白血病治療						☐ # 骨肉腫治療 ☐ # ユーイング肉腫治療		
化学療法＋放射線治療											☐ # TMZ＋頭蓋照射 ☐ # BCNU＋頭蓋照射 ☐ # アルキル化薬＋骨盤照射	
造血幹細胞移植											☐ # CPA, BU, L-PAMを含むレジメン ☐ # 全身照射を含むレジメン	
放射線治療			☐ # 放射性ヨウ素（I-131）									
									☐ # 頭蓋照射 >40 Gy			
					### 腹部／骨盤（思春期前） 10-＜15 Gy ☐		### 腹部／骨盤（思春期前） ≥15 Gy ☐					
					☐ # 腹部／骨盤（思春期以降） 5-＜10 Gy		☐ # 腹部／骨盤（思春期以降） ≥10 Gy ☐		☐ # 腹部／骨盤（成人女性） > 6 Gy			

（日本癌治療学会編 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2024年12月改訂 第2版より一部改変）